



Dispositivo EROS en el manejo de la anorgasmia femenina: Estudio prospectivo de serie de casos en mujeres del Quindío

EROS device in the management of female anorgasmia: Prospective study of the series of cases in women in Quindío

Franklin José Espitia-De La Hoz^{1*} orcid.org/0000-0002-4581-9680

¹ Clínica Sexológica, Armenia, Quindío, Colombia.

Fecha de recepción: Mayo 7 - 2018

Fecha de revisión: Octubre 23 - 2018

Fecha de aceptación: Diciembre 11 - 2018

Espitia- De La Hoz FJ. Dispositivo EROS en el manejo de la anorgasmia femenina: Estudio prospectivo de serie de casos en mujeres del Quindío. Univ. Salud. 2019;21(1):38-47. DOI: <http://dx.doi.org/10.22267/rus.192101.138>

Resumen

Introducción: La anorgasmia es el retraso persistente, o recurrente o ausencia de orgasmo después de una fase de excitación sexual normal, resultando en dificultades personales o interpersonales. El tratamiento se aborda desde diferentes perspectivas. **Objetivo:** Presentar los resultados de la efectividad y seguridad del uso del dispositivo EROS-CTD en el manejo de la anorgasmia femenina, en un grupo de mujeres del Quindío. **Materiales y métodos:** Estudio de reporte de casos, de tipo observacional, descriptivo, prospectivo, de mujeres intervenidas por trastorno del orgasmo, en Armenia, Quindío, Colombia, en el periodo de 2012 a 2017. **Resultados:** Se intervino 39 mujeres; edad media de 35,1 (DS \pm 3,7) años. La anorgasmia primaria fue del 61,53% y la secundaria del 38,36%. El promedio de seguimiento del uso del dispositivo EROS-CTD, fue de 23,7 (DS \pm 4,5) meses por paciente. Al finalizar el estudio, la satisfacción global con el uso del dispositivo es del 89,74%, ninguna de las mujeres presentó complicaciones relacionadas con el uso del aparato. **Conclusiones:** La efectividad del tratamiento de la anorgasmia femenina con el dispositivo EROS-CTD, ha beneficiado favorablemente a las mujeres del estudio.

Palabras clave: Efectividad; mujeres; orgasmo; seguridad; terapia. (Fuente: DeCS, Bireme).

Abstract

Introduction: Anorgasmia is the persistent, or recurrent, or absence of orgasm after a normal phase of sexual arousal, resulting in personal or interpersonal difficulties. Treatment is approached from different perspectives. **Objective:** To present the results of the effectiveness and safety of the use of the EROS-CTD in the management of female anorgasmia in a group of women from Quindío. **Materials and methods:** A descriptive, prospective observational study of case reports was carried out with women intervened by orgasm disorder in Armenia, Quindío, Colombia, from 2012 to 2017. **Results:** 39 women were intervened whose average age was 35.1 (DS \pm 3.7). Primary anorgasmia was 61.53% and the secondary was 38.36%. The average follow-up of the use of EROS-CTD was 23.7 (DS \pm 4.5) months per patient. At the end of the study, overall satisfaction with the use of the device is 89.74%, none of the women presented complications related to the use of the appliance. **Conclusions:** The effectiveness of the treatment of female anorgasmia with EROS-CTD has benefited the women of the study.

Key words: Effectiveness; women; orgasm; safety; therapy. (Source: DeCS, Bireme).