



Perfil morfológico en levantadores de pesas federados de la región de Valparaíso, Chile

Morphological profile of federated weightlifters from the Valparaiso region, Chile

Héctor Fuentes-Barria^{1*} orcid.org/0000-0003-0774-0848

Sebastián Urbano-Cerda¹ orcid.org/0000-0003-0508-6985

Raúl Aguilera-Eguía² orcid.org/0000-0002-4123-4255

Catalina González-Wong³ orcid.org/0000-0003-0360-8567

Valentina Vera-Aguirre⁴ orcid.org/0000-0003-3050-5192

1. Escuela de Ciencias del Deporte y Actividad Física, Facultad de Salud. Universidad Santo Tomás. Santiago, Chile.
2. Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Carrera de kinesiología. Universidad Católica de la Santísima Concepción. Concepción, Chile
3. Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo. Santiago, Chile.
4. Escuela de Nutrición y Dietética, Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud. Universidad San Sebastián. Santiago, Chile.

Fecha de recepción: Noviembre 22 - 2019

Fecha de revisión: Agosto 20 - 2020

Fecha de aceptación: Abril 29 - 2021

Fuentes-Barria H, Urbano-Cerda S, Aguilera-Eguía R, González-Wong C, Vera-Aguirre V. Perfil morfológico en levantadores de pesas federados de la región de Valparaíso, Chile. Univ. Salud. 2021;23(2):162-167. DOI: <https://doi.org/10.22267/rus.212302.228>

Resumen

Introducción: En la halterofilia los perfiles antropométricos permiten una mejor planificación y ejecución del entrenamiento deportivo. **Objetivo:** Describir y comparar según sexo, el perfil antropométrico y somatotipo de levantadores de pesas federados de la región de Valparaíso, Chile. **Materiales y métodos:** Estudio descriptivo, transversal. Participaron 40 adultos levantadores de pesas. La evaluación antropométrica fue realizada utilizando el protocolo de medición y marcaje de la Sociedad Internacional de Avances en Cineantropometría, método pentacompartimental de Ross y Kerr y somatotipo de Heath-Carter. Se aplicó la T de Student para muestras independientes y U Mann-Whitney para comparar características antropométricas entre grupos. El poder estadístico y el tamaño efecto se calculó con “d” de Cohen. **Resultados:** Existen diferencias significativas entre grupos, para masa muscular relativa ($p=0,003$; $d=0,96$) y absoluta ($p\leq 0,001$; $d=2,42$); masa adiposa relativa ($p\leq 0,001$; $d=1,46$); masa ósea absoluta ($p\leq 0,001$; $d=1,41$); masa piel relativa ($p\leq 0,001$; $d=1,96$) y absoluta ($p\leq 0,001$; $d=0,97$); masa residual relativa ($p=0,006$; $d=1,08$) y absoluta ($p\leq 0,001$; $d=2,09$), mientras que la distribución del somatotipo clasifica al grupo masculino como Endo-Mesomorfo y al femenino como Mesomorfo-Endomorfo, observando diferencias significativas en el mesomorfismo ($p\leq 0,001$; $d=1,48$). **Conclusiones:** Existe un predominio del somatotipo mesomórfico, existiendo diferencias significativas en los componentes de composición corporal.

Palabras clave: Levantamiento de peso; antropometría; somatotipos; rendimiento atlético. (Fuente: DeCS, Bireme).

Abstract

Introduction: Anthropometric profiles allow better planning and execution of sports training in weightlifting. **Objective:** To describe and compare, according to gender, the anthropometric profile and somatotype of federated weightlifters from the Valparaiso region of Chile. **Materials and methods:** A descriptive cross-sectional study that included 40 adult weightlifters. The anthropometric assessment was carried out using the measurement and marking protocol of the International Society for Advances in Kinanthropometry, Ross and Kerr pentacompartimental method, and Heath-Carter somatotype. A Student's t test was applied for independent samples and U Mann-Whitney was used to compare anthropometric characteristics between groups. The statistical power and effect size were calculated using Cohen's “d”. **Results:** There are significant differences between groups for: relative ($p=0.003$; $d=0.96$) and absolute ($p\leq 0.001$; $d=2.42$) muscle mass; relative fat mass ($p\leq 0.001$; $d=1.46$); absolute bone mass ($p\leq 0.001$; $d=1.41$); relative ($p\leq 0.001$; $d=1.96$) and absolute ($p\leq 0.001$; $d=0.97$) skin mass; relative ($p=0.006$; $d=1.08$) and absolute ($p\leq 0.001$; $d=2.09$) residual mass. Based on the somatotype distribution, the male and female groups were classified as Endo-Mesomorph and Mesomorph-Endomorph, respectively, which showed significant differences in mesomorphism ($p\leq 0.001$; $d=1.48$). **Conclusions:** There is a predominance of the mesomorphic somatotype, with significant differences in the components of the body composition.

Keywords: Weight lifting; anthropometry; somatotypes; athletic performance. (Fuente: DeCS, Bireme).

*Autor de correspondencia

Héctor Fuentes-Barria

e-mail: hectorfuentesbarria@gmail.com

[162]

mayores cambios absolutos⁽²⁰⁾. Respecto a esto, las hormonas sexuales también pueden explicar en parte las diferencias no significativas sobre la masa ósea relativa y significativas para la masa ósea absoluta, puesto que la densidad mineral ósea y la distribución de la masa corporal dependen de hormonas como la testosterona la cual puede regular cambios ante una masa absoluta equivalente⁽²¹⁾. Por otro lado, las diferencias en torno a la masa residual podrían explicarse por la capacidad de retención de líquidos internos atribuidos a los controles de pesaje característicos de este tipo de deportes⁽²²⁾.

En cuanto al somatotipo, los hallazgos de este y otros estudios plantean que el desarrollo del tejido adiposo representa una desventaja para el rendimiento óptimo deportivo, puesto que un bajo componente mesomórfico supone una facilidad para aumentar el desarrollo del tejido adiposo por causa de la dieta energética elevada, a modo de compensar la falta de desarrollo muscular en levantadores con un nivel de entrenamiento normal o bajo^(2,11-14). En este sentido, los antecedentes antropométricos teóricos propuestos por Heath y Carter están determinados por múltiples factores genéticos y ambientales, no obstante, se ha aceptado que el componente mesomorfo se puede relacionar directamente con el desarrollo de la masa y fuerza muscular, mientras que la baja linealidad (ectomorfismo) se puede asociar inversamente al desarrollo del endomorfismo y mesomorfismo^(2,17).

Todas las diferencias observadas en los resultados antropométricos entre los sexos masculino y femenino, cobran una gran implicancia en levantadores de pesas, debido a que las masas adiposa y magra determinan las características propias del somatotipo que diferencian a los atletas de élite de aquellos que no lo son^(2,10,13).

En este contexto, la evidencia científica ha planteado que una alimentación incorrecta podría llegar a condicionar la composición corporal y el rendimiento deportivo en levantadores de pesas, motivo por el cual las recomendaciones tradicionales para mantener un balance energético han propuesto un consumo de entre 4 a 7 g/kg de peso de carbohidratos y 1,6 a 2 g/kg de peso de proteínas como una alternativa para cubrir los requerimientos de este deporte, mientras que las recomendaciones actuales se han centrado sobre el post-entrenamiento, sugiriendo el uso de una combinación de entre 0,8 a 1,2 g/kg de peso de

carbohidratos con 0,4 g/kg de peso de proteínas para procurar disminuir la masa grasa, aumentar el tejido magro y por consecuencia mejorar el rendimiento deportivo disminuyendo las diferencias antropométricas reportadas en el presente estudio⁽²⁾.

Conclusiones

Existen diferencias estadísticamente significativas en las cinco variables de composición corporal excepto la masa adiposa absoluta y ósea relativa, así como un somatotipo mesomórfico predominante. En este contexto, las intervenciones actuales proponen centrarse en disminuir la masa grasa, aumentar el tejido magro en ambos sexos con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo disminuyendo las diferencias antropométricas; sin embargo, la escasez de investigaciones similares en población chilena no permite establecer un perfil morfológico ni estrategias específicas orientadas a optimizar los niveles de fuerza e hipertrofia relacionados al rendimiento deportivo en levantadores de pesas.

Limitaciones del estudio

Esta investigación se encuentra limitada por la heterogeneidad del tamaño muestral (27 hombres y 13 mujeres), además de la baja potencia estadística que aumentó la probabilidad de presentar un error tipo II en 4 de las 13 variables analizadas. No obstante, a pesar de estas limitaciones la significancia estadística obtenida y el gran tamaño de efecto en las 9 variables restantes reflejan las diferencias observadas en la composición corporal de la muestra estudiada.

Agradecimientos: A todos quienes participaron en este estudio.

Conflicto de intereses: Los autores declaramos que no tener ningún tipo de conflicto de interés.

Referencias

1. Suchomel TJ, Comfort P, Stone MH. Weightlifting pulling derivatives: Rationale for Implementation and Application. *Sports Med.* 2015;45(6):823-39. doi: 10.1007/s40279-015-0314-y.
2. Martínez-Rodríguez A, Tundidor-Duque RM, Alcaraz PE, Rubio-Arias JA. Estrategias dietéticas y composición corporal en halterofilia de élite: Revisión sistemática. *Rev. Esp Nutr Hum Diet.* 2017;21(3):237-47. doi: 10.14306/renhyd.21.3.353.
3. Participants. International Weightlifting Federation [Internet]. [cited 2020 Aug 31]. Disponible en: https://www.iwf.net/weightlifting_/participants/

4. Otto WH, Coburn JW, Brown LE, Spiering BA. Effects of weightlifting vs. kettlebell training on vertical jump, strength, and body composition. *J Strength Cond Res.* 2012;26(5):1199-202. doi: 10.1519/JSC.0b013e31824f233e.
5. Crewther BT, Obmiński Z, Cook CJ. Serum cortisol as a moderator of the relationship between serum testosterone and olympic weightlifting performance in real and simulated competitions. *Biol Sport.* 2018;35(3):215-21. doi:10.5114/biolSport.2018.74632.
6. Storey A, Smith HK. Unique aspects of competitive weightlifting. *Sport Med.* 2012;42(9):769-90. doi: 10.1007/bf03262294.
7. Ryan-Stewart H, Faulkner J, Jobson S. The influence of somatotype on anaerobic performance. Barbosa TM, editor. *PLoS One.* 2018;13(5):e0197761. doi: 10.1371/journal.pone.0197761.
8. Fields JB, Metoyer CJ, Casey JC, Esco MR, Jagim AR, Jones MT. Comparison of body composition variables across a large sample of national collegiate athletic association women athletes from 6 competitive sports. *J Strength Cond Res.* 2018;32(9):2452-7. doi: 10.1519/JSC.0000000000002234.
9. Vaquero-Cristóbal R, Alacid F, Esparza-Ros F, Muyor JM, López-Miñarro PÁ. Características morfológicas y perfil antropométrico en mujeres que practican pilates clásico y mat clásico. *Int J Morphol.* 2014;32(2):695-702. doi:10.4067/S0717-95022014000200052.
10. Serairi Beji R, Megdiche Ksouri W, Ben Ali R, Saidi O, Ksouri R, Jameleddine S. Evaluation of nutritional status and body composition of young Tunisian weightlifters. *Tunis Med.* 2016;94(2):112-7. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27532526/>
11. Pons V, Riera J, Galilea PA, Drobnic F, Banquells M, Ruiz O. Características antropométricas, composición corporal y somatotipo por deportes. Datos de referencia del CAR de San Cugat, 1989-2013. *Apunt Med l'Esport.* 2015;50(186):65-72. doi:10.1016/j.apunts.2015.01.002.
12. López C, Aragonés MT. Somatotipo y porcentaje de grasa corporal en halterofilia. *Apunts Med Esport.* 1989;26(101):151-6. Disponible en: <https://www.apunts.org/es-somatotipo-grasa-corporal-halterofilia-articulo-X0213371789050739>
13. Fernández Vieitez JA, Ricardo Aguilera R. Estimación de la masa muscular por diferentes ecuaciones antropométricas en levantadores de pesas de alto nivel. *Arch med Deport.* 2001;18(86):585-91. Disponible en: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-23214?lang=es>
14. Rodríguez PX, Castillo VO, Tejo CJ, Rozowski NJ. Somatotipo de los deportistas de alto rendimiento de Santiago, Chile. *Rev Chil Nutr.* 2014;41(1):29-39. doi:10.4067/S0717-75182014000100004.
15. da Silva VS, Vieira MF. International society for the advancement of kinanthropometry (Isak) global: International accreditation scheme of the competent anthropometrist. *Rev Bras Cineantropometria e Desempenho Hum.* 2020;22:e70517. doi: 10.1590/1980-0037.2020v22e70517.
16. Ross WD, Kerr DA. Fraccionamiento de la masa corporal: Un nuevo método para utilizar en nutrición clínica y medicina deportiva. *Apunts Sports Med.* 1991;28(109):175-88. Disponible en: <https://www.apunts.org/en-fraccionamiento-masa-corporal-un-nuevo-articulo-X0213371791052237>
17. Bazzyler CD, Mizuguchi S, Zourdos MC, Sato K, Kavanaugh AA, DeWeese BH, et al. Characteristics of a national level female weightlifter peaking for competition: a case study. *J Strength Cond Res.* 2018;32(11):3029-38. doi: 10.1519/JSC.0000000000002379.
18. Ahtiainen JP, Walker S, Peltonen H, Holviala J, Sillanpää E, Karavirta L, et al. Heterogeneity in resistance training-induced muscle strength and mass responses in men and women of different ages. *Age (Omaha).* 2016;38(1):1-13. doi: 10.1007/s11357-015-9870-1.
19. Zamboni M, Turcato E, Santana H, Maggi S, Harris TB, Pietrobelli A, et al. The relationship between body composition and physical performance in older women. *J Am Geriatr Soc.* 1999;47(12):1403-8. doi:10.1111/j.1532-5415.1999.tb01557.x.
20. Dao H, Kazin RA. Gender differences in skin: a review of the literature. *Gend Med.* 2007;4(4):308-28. doi:10.1016/s1550-8579(07)80061-1.
21. Snyder PJ, Kopperdahl DL, Stephens-Shields AJ, Ellenberg SS, Cauley JA, Ensrud KE, et al. Effect of testosterone treatment on volumetric bone density and strength in older men with low testosterone: A controlled clinical trial. *JAMA Intern Med.* 2017;177(4):471-9. doi:10.1001/jamainternmed.2016.9539.
22. Herrera-Valenzuela T, Valdés-Badilla P, Soto-Voisier E, Verdugo-Miranda F, Cancino-López J, Sáez-Fuentes M, et al. Rapid weight loss: The case of combat sports. *Rev. méd Chile.* 2018;146(8):947-8. doi: 10.4067/s0034-98872018000800947.